NUTRISERVICE s.r.l.
via dello strone 8/A 25020 San Paolo (BS)
tel 030 9979331 REA N°342171 Brescia CF e P IVA 01799670987
Aut.Min.Ind.Comm. n MG890-RA del 2/12/93 ric. (digs) 13/03/99) n 123 art 2 comma 2 lett c) alfa IT00573MN

MILK 832 LA

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione:

Soia integrale tostata (da soia geneticamente modificata), Mangime a base di semi di Girasole decorticato, Crusca di frumento, Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Magnesio Ossido, Mangime a base di farina di soia decorticata (da soia geneticamente modificata), Sali di Calcio di Acidi Grassi di Palma, Melasso di canna da zucchero, Coltura di Lievito Saccharomyces cerevisiae inattivato.

Componenti analitici % stq

Proteina grezza	32,00 %
Grassi grezzi	8,00 %
Fibra grezza	10,30 %
Ceneri grezze	13,50 %
Sodio	1,50 %
Magnesio	0,70 %

Additivi per kg

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite		3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	4,00 mg
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	36.000,00 UI	3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito)	2,50 mg
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)	5.000,00 UI	**Composti di oligoelementi**	
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	60,00 mg	3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato)	40,00 mg
3a160(a) Beta-carotene	1,50 mg	3b202 Iodio (Iodato di calcio anidro)	4,00 mg
3a880 Biotina	0,25 mg	3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato)	200,00 mg
3a890 Colina Clor.	216,25 mg	3b503 Manganese (Solfato manganoso, monoidrato)	100,00 mg
3a316 Acido folico	1,00 mg	3b802 Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti)	0,50 mg
3a315 Niacinamide	50,00 mg	3b605 Zinco (Solfato di zinco monoidrato)	100,00 mg
3a841 Calcio D-pantotenato	25,00 mg	**Urea e suoi derivati**	
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)	4,00 mg	3d1 Urea	17.280,00 mg
3a836 Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,05 mg	**Leganti**	
3a825i Vitamina B2 (Riboflavina)	3,75 mg	E 554 Silicato di sodio e di alluminio,sintetico	

Istruzioni per l'uso

Mangime per vacche da latte da somministrare in miscela con foraggi aziendali e altri concentrati.non superare il 10 % della razione totale giornaliera.
3d1- Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera può derivare da azoto ureico.Analisi grassi previa idrolisi acida.

3d1 - Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N.3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2.3b405 - Se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo.

Da consumarsi preferibilmente entro : /