NUTRISERVICE s.r.l.
via dello strone 8/A 25020 San Paolo (BS)
tel 030 9979331 REA N°342171 Brescia CF e P IVA 01799670987
Aut.Min.Ind.Comm. n MG890-RA del 2/12/93 ric. (digs) 13/03/99) n 123 art 2 comma 2 lett c) alfa IT00573MN

PR 550

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione:

Granoturco (da granoturco geneticamente modificato), Soia integrale tostata (da soia geneticamente modificata), Farinaccio di frumento, Crusca di frumento, Frumento tenero, Orzo, Mangime a base di farina di soia decorticata (da soia geneticamente modificata), Cloruro di sodio, Bicarbonato di sodio, Melasso di canna da zucchero, Carbonato di calcio, Lithothamne, Fosfato bicalcico, Glutine di granoturco, Bentonite, Coltura di Lievito Saccharomyces cerevisiae inattivato.

Componenti analitici % stq

Proteina grezza	16,00 %
Grassi grezzi	5,70 %
Fibra grezza	5,00 %
Ceneri grezze	8,00 %
Sodio	1,40 %

Additivi per kg

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite	
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	28.800,00 UI
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)	4.000,00 UI
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	48,00 mg
3a836 Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,04 mg
3a160(a) Beta-carotene	1,20 mg
3a880 Biotina	0,20 mg
3a890 Colina Clor.	173,00 mg
3a316 Acido folico	0,80 mg
3a315 Niacinamide	40,00 mg
3a841 Calcio D-pantotenato	20,00 mg
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)	3,20 mg
3a825i Vitamina B2 (Riboflavina)	3,00 mg
3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	3,20 mg
3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito)	2,00 mg
Composti di oligoelementi	
3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato)	32,00 mg
3b202 Iodio (Iodato di calcio anidro)	3,20 mg
3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato)	160,00 mg
3b503 Manganese (Solfato manganoso, monoidrato)	80,00 mg
3b802 Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti)	0,40 mg
3b605 Zinco (Solfato di zinco monoidrato)	80,00 mg

Istruzioni per l'uso

Mangime per vacche da latte da somministrare in miscela con foraggi aziendali e altri concentrati. Non superare il 20 % della razione totale giornaliera. Può contenere acidi grassi salificati come veicolo e protezione ruminale delle vitamine e/o amminoacidi. Analisi grassi previa idrolisi acida. Conforme ai disciplinari di produzione del Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP e Provolone Valpadana DOP. Sostanze zuccherine non superiori al 6%.

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2.3b405 - Se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo.

Da consumarsi preferibilmente entro :